

COVID19 en population pédiatrique

- **Le vaccin anti-COVID19 d'AstraZeneca va être testé chez l'enfant** : selon la BBC, une étude incluant plus de 300 volontaires de 6 à 17 ans devrait débuter d'ici la fin du mois de février 2021.
- **SARS-CoV2 et syndrome Kawasaki-like** : supériorité des **Immunoglobulines IV associées à la méthylprednisolone** vs IgIV seules chez l'enfant (JAMA du 1^e février 2021) [Lien vers la publication](#)
- **COVID19 aux soins intensifs pédiatriques** : l'Association des Pharmaciens des Établissements de Santé du Québec fait le point (décembre 2020) [Lien vers la FAQ Pédiatrie](#)
- [Webinar](#) de l'AFPA et de la SFP (Odile Launay, Alain Fischer et Robert Cohen) sur les vaccins anti-COVID19 chez les enfants (19 janvier 2021)

Actualités hors pandémie

- Après la majoration du risque de fracture, **le JAMA fait le lien entre l'utilisation d'inhibiteurs de la pompe à protons et le risque d'asthme chez les enfants** ([JAMA du 8 février 2021](#)).
- La [publication au J.O](#) de la **prise en charge de la vaccination HPV pour les garçons** a pris effet ! C'est parti pour les vaccinations des garçons !
- [Nouvelle information de l'ANSM](#) sur la fosphénytoïne afin d'éviter l'utilisation chez les enfants de moins de 5 ans et les erreurs médicamenteuses
- Après la SFP, [l'ANSM parle à son tour de la vitamine D](#) chez les enfants : recourir aux médicaments et non aux compléments alimentaires pour prévenir le risque de surdosage
- Ceftaroline Zinforo® inscrit sur la liste des [spécialités agréées aux collectivités](#) dans l'extension d'indication suivante : traitement des infections compliquées de la peau et des tissus mous chez les enfants de la naissance à moins 2 mois et [l'avis de la HAS](#) correspondant avec une mise en garde spécifique pour les nouveau-nés et nourrissons
- Mise à dispo de Sevelamer Renvela® poudre en suspension buvable 0,8g pour adaptation de dose chez l'enfant et de glucagon nasal (Baqsimi®) en récipient unidose à partir de 4 ans, pour le moment non remboursé.
- Contingemment du Pediaven® [Nouveau-né 2](#) et du [Pédiaven G20](#)
- Extensions de [prise en charge dans le traitement du](#) diabète chez l'enfant : insuline asparte Fiasp® à partir de 1 an et insuline glargine Toujéo® à partir de 6 ans.

Autre point d'intérêt pratique

- **Doliprane® 2.4% suspension buvable : changement de couleur !** La suspension buvable devient blanche : l'azorubine (E122), colorant, a été retiré de la formulation par le fabricant (comme dans les formes Doliprane Liquiz 200mg et 300mg).

Se former en continu

- **Dossier du CNHIM** décembre 2020 sur l'Épilepsie **chez l'enfant**
- "Clepsy", le nouveau site **pédopsychiatrie** de l'hôpital Robert Debré (AP-HP) : Des clés pour accompagner les **familles** dans leur quotidien <https://www.clepsy.fr/>

