

NOM
ALLERGIES

Prénom

TROUSSE D'URGENCE

'F cvg'f g't²t go r vkp

1. Adrénaline
+ Chambre d'inhalation
2. Bronchodilatateur
3. Antihistaminique
4. Divers

EPIPEN



Enlever le capuchon bleu



Placer l'extrémité orange du stylo sur la face extérieure de la



Appuyer fermement la pointe orange dans la cuisse jusqu'à entendre un dé clic et maintenez appuyé pendant 10 sec



Puis masser la zone d'injection

JEXT



Enlever le bouchon jaune



Placer l'extrémité noire du stylo sur la face extérieure de la cuisse



Appuyer fermement jusqu'à entendre un dé clic en tenant la cuisse et maintenez appuyé pendant 10 sec.



Puis masser la zone d'injection

ANAPEN

Code: 34-009



Android



Apple



Enlever le capuchon noir protecteur de l'aiguille



Retirer le bouchon noir protecteur



Appuyer fermement le stylo sur la face extérieure de la cuisse



Appuyer sur le bouchon rouge de déclenchement et maintenir appuyé pendant 10 sec, puis masser la zone d'injection

EMERADE



Enlever le capuchon protecteur de l'aiguille




Placer et appuyer le stylo contre la face externe de la cuisse. Maintenir le stylo contre la cuisse pendant environ 5 secondes



Masser légèrement le site d'injection

UNE REACTION ALLERGIQUE

J'EVALUE IMMEDIATEMENT LA GRAVITE DE LA REACTION



La REACTION est **GRAVE**
si 1 seul de ces signes parmi

- Ma voix change
- Je respire mal, je siffle, je tousse
- J'ai très mal au ventre, je vomis
- Mains, pieds, cuir chevelu me démangent
- Je me sens mal ou bizarre
- Je fais un malaise
- Autres signes :

Cela peut être encore plus grave
si plusieurs de ces signes sont associés

La REACTION est **MODEREE**
'tk3'tgwif g'égutli pgu't cto k

- Ma bouche pique, mes lèvres gonflent
- Mes yeux piquent, mon nez coule
- Des plaques rouges qui démangent
- J'ai un peu mal au ventre
- et j'ai envie de vomir
- Autres signes :

**MAIS JE PARLE
et RESPIRE BIEN**

LES BONS REFLEXES

1. Allonger l'enfant ou le laisser ½ assis en cas de gêne respiratoire
2. Injecter dans la face antéro-externe de la cuisse
3. Puis appeler SAMU (15 ou 112)
4. Si gêne respiratoire : Inhaler avec la chambre d'inhalation
jusque 4 à 10 bouffées, à répéter selon gêne après 10 à 15 minutes.

70"

En attendant les secours, une 2° INJECTION de
peut être faite si les
symptômes persistent après 5 minutes ou plus.

LES BONS REFLEXES

- 1.
- 2.
3. Surveiller l'enfant jusque disparition des symptômes
4. Prévenir les parents, contacter le médecin.

EN L'ABSENCE D'AMELIORATION

J'EVALUE DE NOUVEAU la GRAVITE DE LA REACTION