

Troubles de la déglutition en gériatrie: des pratiques hétérogènes et non conformes pour administrer les médicaments

Mots-clés : #établissements de santé #produits de santé #congrès #pharmaciens #géronto #bon usage-RTU #qualité-sécurité des soins #PUI #médicaments #Île-de-France

(Par Sylvie LAPOSTOLLE, au congrès de la SFPC)

STRASBOURG, 17 mars (APMnews) - Les troubles de la déglutition paraissent trop peu recherchés à l'admission en gériatrie et les bonnes pratiques d'adaptation galénique mal connues, selon un audit réalisé dans un établissement et présenté au congrès de la Société française de pharmacie clinique (SFPC) qui s'est tenu à Strasbourg jusqu'à mercredi.

Les troubles de la déglutition sont fréquemment observés chez la personne âgée en cours d'hospitalisation, après un accident vasculaire cérébral (AVC) ou encore en cas de maladie de Parkinson ou d'Alzheimer, a rappelé dimanche Amélie Chane-Kene du centre hospitalier (CH) Rives de Seine à Neuilly-sur-Seine. Ils peuvent être à l'origine de difficultés d'administration des traitements induisant une mauvaise observance. Ils exposent le patient à un risque iatrogène lié à un usage non adapté à la galénique des médicaments.

Un audit a été réalisé afin de dresser un état des lieux des pratiques et de la prise en compte des troubles de la déglutition dans le parcours du patient.

Deux questionnaires distincts ont été adressés l'un aux infirmiers (IDE) et l'autre aux médecins. Les principales données recueillies étaient l'évaluation de ces troubles à l'admission, la recherche d'alternatives médicamenteuses, la préparation et l'administration des médicaments en cas de troubles avérés et la traçabilité des étapes dans le dossier médical.

Au total, 71 questionnaires (46 IDE et 25 médecins) ont été recueillis auprès de cinq services de soins gériatriques et adultes.

À l'admission, 45,6% des IDE (21/46) recherchent systématiquement des troubles de la déglutition des patients hospitalisés. En cas de troubles avérés, 56,5% des IDE (26/46) modifient systématiquement la galénique des médicaments mais en informent le médecin dans seulement 8,7% des cas (8/46).

La majorité des IDE (65,2%; 30/46) se basent sur leur expérience ou n'utilisent aucune source d'information avant de modifier la galénique d'un médicament. Les IDE déclarent procéder au broyage des comprimés et à l'ouverture des gélules dans le même sachet dans 97,8% des cas (45/46) et 19,6% d'entre elles (9/46) tracent systématiquement cet acte dans le dossier médical. L'identification systématique du sachet est réalisée par 60,9% des IDE (28/46).

Toutes les IDE ont déjà broyé au moins un comprimé gastro-résistant ou à libération prolongée (avec un écrase-comprimés pour 86,7% ou un mortier pour 13,3%) et 73,9% d'entre elles (34/46) ont déjà utilisé un produit laitier et/ou un liquide chaud comme véhicule d'aide à l'administration alors qu'ils peuvent dénaturer le médicament.

Seuls 20% des médecins déclarent rechercher systématiquement des troubles de la déglutition à l'admission (5/25) et 44% d'entre eux (11/25) affirment ne pas se sentir à l'aise quant à cette évaluation. En cas de troubles avérés, la majorité des médecins (72%; 18/25) tracent les informations dans le dossier médical mais 52% d'entre

eux (13/25) ne prescrivent jamais la nécessité de broyer les comprimés et/ou l'ouverture des gélules, ce qui veut dire que c'est l'IDE qui s'en charge.

Cet audit a mis en évidence une hétérogénéité des pratiques concernant la prise en charge des patients atteints de troubles de la déglutition ainsi qu'une mauvaise connaissance des bonnes pratiques et risques associés aux mésusages des médicaments.

Un groupe de travail pluridisciplinaire composé d'un médecin gériatre, de pharmaciens, d'IDE et d'une orthophoniste a été créé afin d'établir et diffuser des règles de bon usage des patients atteints de troubles de la déglutition, a indiqué Amélie Chane-Kene.

Ses principales missions seront la mise à jour de protocoles et documents institutionnels, le paramétrage informatique du logiciel de prescription et un étiquetage dans les armoires de service, ainsi que la mise en place de formations pratiques en priorité en gériatrie, a-t-elle détaillé.

"Ce travail sera présenté en commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles (Comedims) et au comité de liaison en alimentation et nutrition (Clan) très prochainement (en mai et juin), afin de sensibiliser l'ensemble des professionnels intervenant dans le parcours du patient atteint de troubles de la déglutition, a-t-elle ajouté.

sl/nc/APMnews

[SL5R8PF9H]

POLSAN - ETABLISSEMENTS CONGRÈS ENVOYÉ SPÉCIAL

Aucune des informations contenues sur ce site internet ne peut être reproduite ou rediffusée sans le consentement écrit et préalable d'APM International. Les informations et données APM sont la propriété d'APM International.

©1989-2022 APM International -

<https://www.apmnews.com/depeche/84167/380206/troubles-de-la-deglutition-en-geriatrie-des-pratiques-heterogenes-et-non-conformes-pour-administrer-les-medicaments>