



## Ruptures & Arrêt de commercialisation

Ammonaps® en granulés : forme de phénylbutyrate de sodium en arrêt de commercialisation au profit d'autres formes galéniques

Risque de rupture de stock des médicaments de l'expérimentation à base de CBD seul (CBD 50 LGP Classic)

Attentions aux problématiques liées aux statuts et indication différentes entre les présentations en cas de besoin de relais. Pour l'indication "épilepsie" : recommandation de passer à l'Epidiolex®

[Information de sécurité - ANSM](#)

"En cas de rupture sèche, les prescripteurs pourraient prescrire de l'Epidyolex aux patients épileptiques actuellement traités par du CBD seul (CBD 50 LGP Classic), dans le cadre de son autorisation de mise sur le marché."

## Point ANSM

Alerte de sécurité

**Le Prodilantin® 75 mg/ml ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 5 ans**

- Seule la spécialité Dilantin® 250mg/5mL (phénytoïne sodique), solution injectable est indiquée chez l'enfant de moins de 5 ans pour le contrôle de l'état de mal épileptique de type tonico-clonique (grand mal) ainsi que pour la prévention et le traitement des crises convulsives survenant après une intervention neurochirurgicale et/ou un traumatisme crânien.

- Les posologies de Prodilantin® 75mg/mL et Dilantin® 250 mg/5mL ne sont pas équivalentes.

[Information de sécurité - ANSM \(sante.fr\)](#)

Kaftrio® : extension d'indication du cadre de prescription compassionnelle (CPC) : « Traitement de la mucoviscidose chez les patients âgés de 6 ans et plus non porteurs de la mutation F508del, hormis ceux présentant 2 gènes mutés prédictifs de l'absence de synthèse de protéine CFTR » [ANSM - Décision du 01/06/2023](#)

## Actualités

Nouveaux outils

- 1) [Base de donnée PEDMED \(pédiatrie et Néonatalogie\)](#)
- 2) [Aide-mémoire, médicaments d'urgence en pédiatrie, 6e édition \(CHU Sainte Justine\)](#)

Prescrire propose des formations : prochaines sessions sur le thème « Urgences et situations cliniques à risque grave chez les enfants » (septembre-décembre 2023) [Informations et inscription ici](#)

Mise à disposition de Flucortac® buvable 100 µg/mL (fludrocortisone) : nouveauté => [Informations ici](#)

Avis de la Société Française de Néonatalogie et du Groupe de Pathologie Infectieuse Pédiatrique sur la prévention des infections respiratoires basses à VRS dans la population néonatale, y compris la population des nouveau-nés prématurés : [Avis SFN](#)

## Xarelto 1 mg/ml granulés pour susp. buv.

Publication au Journal Officiel de nouvelles conditions de dispensation: [Lien 1](#). [Lien 2](#)

Arrêté du 26 mai 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

La commission de la transparence recommande du fait d'un risque de mésusage dans l'indication « traitement des événements thromboemboliques veineux (ETE) et prévention des récurrences, chez les nouveau-nés nés à terme, les nourrissons et les jeunes enfants, les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans, après au moins 5 jours d'une anticoagulation initiale par voie parentérale » de réserver à un médecin hospitalier la prescription initiale et d'accompagner la prescription d'une éducation thérapeutique spécifique réalisée par une équipe pluridisciplinaire.

**Le Groupe de Travail Pédiatrie de la SFPC**  
vous souhaite une belle rentrée des classes !